

Акналич сорт винограда

Автор:

17.05.2012 12:31 -

[Армянский НИИВВиП]

Сорт винограда Акналич выведен в 1961 г. Армянским НИИВВиП в результате скрещивания элитных сеянцев С-484 (Мадлен Анжевин × Шасла мускатная) и С-128 (Ичкимар × Январский черный). Селекционный номер 1647/4. Авторы С. А. Погосян, С. С. Хачатрян, М. В. Мелконян.

В 1981 г. принят для государственного испытания. На небольшой площади имеется на Араратской равнине в Армянской ССР.

Описание составлено на Мердзаванской экспериментальной базе Армянского НИИВВиП.

Лист крупный, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный. Пластинка листа желобчатая. Верхняя поверхность сетчато-морщинистая. Верхние вырезки глубокие, закрытые, с яйцевидным просветом и заостренным дном и открытые, лировидные с узким устьем и острым дном. Нижние вырезки едва намечены. Черешковая выемка открытая, лировидная с плоским дном. Зубчики на концах лопастей треугольные с широким основанием. Зубчики по краю листовой пластинки треугольно-пиловидные. Опушение на нижней поверхности листа густое, щетинистое. Черешок короче срединной жилки, светло-зеленый. Осенняя окраска листьев светло-желтая.

Цветок обоеполый.

Гроздь крупная (длина 18,1 см, ширина 11,3 см), коническая и цилиндрико-коническая, плотная.

Ягода средняя и крупная (длина 14—18 мм, ширина 12—16 мм), округлая, черная, со слабым восковым налетом. Кожица тонкая. Мякоть сочная. Вкус приятный с легким мускатным ароматом. Семян в ягоде одно — четыре, чаще два-три.

Семя среднее, овальное, серовато-коричневое.

Сорт винограда Акналич относится к столово-винным сортам очень позднего срока созревания. Техническая зрелость наступает в третьей декаде сентября.

Продолжительность вегетационного периода от распускания почек до полной зрелости ягод—167 дней при сумме активных температур 3515 °С.

Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее (80%).

Урожайность высокая — 165—205 ц/га. Средняя масса грозди 180 г. Процент плодоносных побегов 78. Число гроздей на разившийся побег 1,3, на плодоносный — 1,6.

Морозоустойчивость высокая. Без укрытия кустов выдерживает морозы до минус 28 °С.

Сорт относительно устойчив к милдью и серой гнили (2—3 балла).

В условиях Араратской равнины в Армянской ССР Акналич возделывается корнесобственно. Рекомендуемая формировка — двусторонний кордон на высоком штамбе. Нагрузка на куст 55—60 глазков. Обрезка короткая, на 3—4 глазка.

Предпочитает богатые почвы.

Содержит в процентах к общей массе грозди: сока и плотных частей мякоти 84, кожицы 7,9, гребней 4,5, семян 3,6. Сахаристость сока ягод — 23,6—25,2% при кислотности 5,1—6 г/л.

Используется для приготовления высококачественного красного десертного вина со слабым мускатным ароматом, а также для потребления в свежем виде. Дегустационная оценка десертного вина 8,4 балла.

Как морозостойкий и относительно устойчивый против болезней сорт рекомендуется

Акналич сорт винограда

Автор:

17.05.2012 12:31 -

для выращивания на Араратской равнине в Армянской ССР.

Ведущие признаки сорта винограда: крупный глубоко-ко рассеченный лист с густым щетинистым опушением; крупная цилиндрико-коническая плотная гроздь; средняя или крупная округлая черная ягода с мускатным ароматом; сильнорослый куст; очень поздний срок созревания; высокая морозоустойчивость.

Источник: Ампелография СССР. Отечественные сорта винограда. Москва, 1984 г.